

子どもの定期予防接種の接種年齢及び接種間隔

接種対象年齢および接種間隔は必ず守ってください。法定外となり有料になります。

●BCG（結核）、麻しん風しん（MR）、水痘ワクチン接種後に同じワクチン以外のBCG、麻しん風しん（MR）、水痘ワクチンを接種する場合は、接種間隔を27日以上あける必要があります。

種類	対象年齢	標準的な接種期間	回数	接種間隔	注意点
B型肝炎	初回	1歳の誕生日の前日	2回	27日以上	対象者から除外される児 HBs抗原陽性の母親からの出生で、B型肝炎ウイルスに感染したおそれのある児であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて、組み換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある児は、定期接種の対象者から除きます。
	追加	生後2か月～9か月に至るまでの期間	1回	1回目の注射から139日以上	
ロタウイルスワクチン	《ロタリックス》 出生6週～24週	初回接種開始は生後2か月に至った日から14週6日後まで（注）	2回	27日以上	対象から除外される児 ・腸重積症の既往歴があることが明らかない ・先天性消化管障がい有する児 ・重症複合免疫不全症の所見が認められる児 飲むワクチン（経口接種）です。少し空腹感があるほうがワクチン接種を受けやすいです。 接種後吐き出した場合でも再度の接種は必要ありません。ワクチン接種後は便の中にウイルスが排出されることがまれにあります。接種後7～10日間はオムツ交換後しっかりと手洗いをしてください。 接種後1～2週間は腸重積症の症状に注意する必要があります。「突然激しく泣く」「機嫌が良かったり悪かったりを繰り返す」「嘔吐する」「血便がでる」「ぐったりして顔色が悪い」などの症状が見られたら医師にご相談ください。 （注）15週0日を超えての初回接種は安全性が確立されていないためお勧めしていません。
	《ロタテック》 出生6週～32週		3回	27日以上	
小児用肺炎球菌ワクチン	生後2か月～5歳の誕生日の前日	初回接種開始は生後2か月～7か月に至るまで 追加接種は、1歳～1歳3か月に至るまで	〔初回接種開始が生後2か月～7か月未満〕 初回：3回 追加：1回	初回接種(3回) 生後2か月に至るまでの間に27日以上 追加接種(1回) 初回接種終了後、60日以上の間隔を置いて、生後12か月に至った日以降 【標準的には生後12か月～15か月に至るまでの間で、初回接種終了後60日以上の間隔を置いて後であって生後12か月に至った日以降】	初回接種のうち2回目及び3回目の注射は、生後2か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行いません（追加接種は可能）。
			〔初回接種開始が生後7か月～12か月未満〕 初回：2回 追加：1回	初回接種(2回) 生後2か月に至るまでの間に27日以上 追加接種(1回) 初回接種終了後、60日以上の間隔を置いて、生後12か月に至った日以降	初回接種のうち2回目の注射は、生後2か月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行いません（追加接種は可能）
			〔初回接種開始が1歳～2歳未満〕 2回	60日以上	
			〔初回接種開始が2歳～5歳未満〕 1回		
【五種混合】ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオヒブ	初回	生後2か月～7か月に至るまでの期間	3回	20日以上 【標準的には20～56日】	令和6年4月1日より、四種混合+ヒブワクチンが一緒になった五種混合ワクチンが定期接種対象ワクチンとして追加になりました。四種混合ワクチンで接種していた方は五種混合に切り替えて残りの回数を接種してください。四種混合からの切り替え方は医師にご相談ください。
	追加	生後2か月～7歳6か月の前日	1回	初回接種(3回)終了後、6か月以上 【標準的には6～18か月】	

下記に該当する方は、接種を受ける前に飯塚市の認定を受ける必要があります。担当課へご相談ください。

【長期療養により定期予防接種の機会を逃した方】

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方等、特別の事情があることにより接種対象年齢であった間に定期予防接種を受けることができなかった方は、接種対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができる場合があります。

【骨髄移植や化学療法等により定期予防接種の免疫を失った方】

定期予防接種にて獲得した免疫が、骨髄移植や化学療法等の医療行為により低下または消失したと医師に判断され、再度予防接種を受ける場合の費用を助成します。

種類	対象年齢	標準的な接種期間	回数	接種間隔	注意点
BCG (結核)	1歳の誕生日の前日	生後5か月～8か月に達するまでの期間	1回		
麻しん風しん (MR)	第1期	1歳～2歳の誕生日の前日	1回		1歳になったらなるべく早く第1期の予防接種を受けるように努めてください。
	第2期	平成31年4月2日～令和2年4月1日生 (年長児)	1回		令和7年4月1日～令和8年3月31日まで無料 (期間を超えると任意接種となり有料)
	特例	令和4年4月2日～令和5年4月1日生のお子さんとMR第1期の接種がお済みでない場合は、令和9年3月31日まで定期の予防接種として、無料で接種できます。 平成30年4月2日～平成31年4月1日生のお子さんでMR第2期の接種がお済みでない場合は、令和7年4月1日～令和9年3月31日までの2年間、定期の予防接種として、無料で接種できます。			
水痘 (水ぼうそう)	1歳～3歳の誕生日の前日	1回目の接種は1歳～1歳3か月に達するまで。 2回目の接種は、1回目の接種終了後6か月～12か月までの間隔をおく。	2回	3か月以上 【標準的には6～12か月】	
日本脳炎	第1期	生後6か月～7歳6か月の前日	2回	6日以上 【標準的には6～28日】	接種量 (3歳以上) 各0.5ml (3歳未満) 各0.25ml
	追加第1期	4歳～5歳に達するまでの期間	1回	第1期初回接種終了後、6か月以上 【標準的にはおおむね1年を経過した時期】	
	第2期	9歳～13歳の誕生日の前日	1回		
	特例	平成7年4月2日～平成19年4月1日に生まれたお子さんと日本脳炎予防接種が完了していない場合については20歳未満(20歳の誕生日の前日)までの間、1期・2期の不足分(合計4回分)を定期の予防接種として、無料で接種できます。 該当されるお子さんは、親子(母子)健康手帳で接種回数を確認してください。接種履歴が不明の場合はお問い合わせください。			
【二種混合】ジフテリア破傷風	11歳～13歳の誕生日の前日	11歳～12歳に達するまでの期間	1回		
HPV(子宮頸がん予防)ワクチン	小学6年生～高校1年生相当年齢の女子(平成21年4月2日～平成26年4月1日生まれ)	13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間(中学1年生相当)	3回	《サーバリックスワクチン》 1か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種。 この間隔で接種できなかった場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて1回接種。 《ガーダシルワクチン》 《シルガード9ワクチン》 2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種。 この間隔で接種できなかった場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種。	令和5年4月1日より「シルガード9ワクチン」が定期接種対象ワクチンとして追加となりました。 原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中からシルガード9に変更し、残りの接種を完了することも可能です。
			2回	《シルガード9ワクチンの初回接種を15歳の誕生日前日までに接種した場合に限り》 6か月の間隔をおいて2回接種。 この間隔で接種できなかった場合は、5か月以上の間隔をおいて2回接種。	
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間に限り、下記に該当する方は接種完了となる3回接種(注1)のうち不足分を接種(無料)できます(キャッチアップ接種の条件付き延長) 対象者: ①キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれの女性)で、キャッチアップ接種期間(令和4年4月1日～令和7年3月31日)にHPVワクチンを1回以上接種した方 ②平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれの女性で、キャッチアップ接種期間(令和4年4月1日～令和7年3月31日)にHPVワクチンを1回以上接種した方 注1:15歳未満で1回目を9価ワクチン(シルガード9)を接種した方で、1回目と2回目の接種間隔が5か月以上あいている方は、2回で接種完了となります。					

※原則保護者の同伴が必要ですが、日本脳炎とHPVについては、13歳以上16歳未満の方で、下記①～③の要件を満たした場合、保護者が同伴しなくても接種を受けることができます。
①市町から配られる説明書を保護者が事前に読み、予防接種の効果や副作用について理解していること。②保護者が予診票に必要事項を記入すること。③保護者が予診票の保護者自署欄と予診票裏面の同意欄に自筆で必要事項を記入すること。
※16歳以上の方は保護者の同意がなくても予防接種を受けることができます。
※医療機関によっては保護者同伴を要件としている場合がありますので、予約時にご確認ください。

接種時の注意事項

- ①予防接種はお子さんの体調の良い時に受けるようにしましょう。
- ②「予防接種と子どもの健康」をよく読んで予防接種の効果や副反応を理解して受けましょう。
- ③親子(母子)健康手帳は必ず持って行きましょう。
- ④予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任をもって記入しましょう。
- ⑤お子さんの日頃の健康状態をよく知っている保護者が連れて行きましょう。

事前に医師に相談すること

- ①心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障がいなどで治療を受けているお子さん
- ②予防接種で接種後2日以内に発熱のみられたお子さん及び、発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられたお子さん
- ③過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがあるお子さん
- ④過去に免疫不全の診断がされているお子さん及び近親者に先天性免疫不全者の方がいるお子さん
- ⑤ワクチンの成分にアレルギーがあると言われたことのあるお子さん
- ⑥ラテックス過敏症のお子さん
- ⑦BCG接種においては、家族に結核患者がいて長期に接触があったお子さん
- ⑧錫重積症にかかったことがあるお子さん

詳細や最新情報は
飯塚市ホームページで
ご確認ください。



飯塚市公式SNSでさまざまな情報をお届けしています。



令和7年度

飯塚市内定期予防接種実施医療機関

医療機関の最新情報は飯塚市ホームページでご確認ください。



接種方法
下記の医療機関に
予約が必要です。
(保護者同伴)

**予約時に
診療日・
診療時間等
をご確認
ください。**

持っていくもの
親子(母子)
健康手帳
紛失の場合は
お問い合わせ
ください。



- ☆お子さんのかかりつけ医療機関で接種しましょう。
- ☆「予防接種と子どもの健康」を読んで、予防接種の効果や副反応を理解して受けましょう。
- ☆予診票は医療機関にございます。
- ☆複数回接種するワクチンはなるべく同じ医療機関で接種を受けてください。

予防接種に関する問い合わせ先
飯塚市 健幸保健課 地域保健係
(穂波庁舎)

☎0948-96-8615

FAX : 0948-25-8994

医療機関名	住所	電話番号	B型肝炎	ロタウイルス	肺炎球菌 小児用	五種混合	BCG	麻疹 混合(MR- MR)	水痘	日本脳炎	二種混合	HPV
細川小児科内科医院	鯉田1772	0948-22-1088	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
らそうむ内科 笑顔で百歳 クリニック	鯉田2219-20	0948-43-3151	○					○	○	○	○	
弥永内科小児科医院 <i>かかりつけのみ</i>	鯉田2517-201	0948-24-8680			○	○		○	○	○	○	○
津川診療所	新飯塚18-12	0948-22-1466	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
とうウィメンズクリニック	新飯塚4-5	0948-26-7575										○
たけたにクリニック	柏の森43-1	0948-52-5105										○
梶原内科医院	下三緒35-329	0948-23-5563						○		○	○	○
西田内科クリニック	上三緒889-1	0948-24-8555						○	○	○	○	
ひこばえ子どもクリニック	鶴三緒1151-1	0948-52-5230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
柴田みえこ内科・神経内科クリニック <i>お薬手帳持参。かかりつけ医のある方は許可をもらってから。</i>	鶴三緒1547-10	0948-21-0011										○
あい内科・消化器科クリニック	菟田西1-6-24	0948-22-0703	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
みやじま内科・呼吸器内科クリニック	菟田西2-3-52	0948-23-0578								○ <i>2期のみ</i>	○	○
あまいろクリニック飯塚 <i>電話、受付窓口にて要予約</i>	芳雄町19-34 構木ビル2階	0948-80-1806								○ <i>2期のみ</i>	○	○
二宮医院	潤野855	0948-22-3272	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小川内科・循環器内科	吉原町6-1 あいタウン3階	0948-22-2010								○ <i>2期のみ</i>	○	○
いづかこども診療所	吉原町537	0948-80-5630	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
松岡産婦人科医院	飯塚10-10	0948-24-7963										○ <i>保護者同伴</i>
大庭医院	飯塚18-27	0948-22-1009	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
松浦医院	飯塚19-20	0948-22-3657	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
田中クリニック	本町17-12	0948-22-3280										○
千手医院	西町4-38	0948-22-3363						○	○	○	○	

